

Ame a su niño/a.



Vacunas protegen a su niño/a contra estas enfermedades peligrosas y son una de las mejores maneras de mantener a sus niños saludables.



Vacunas son seguras. Los niños pueden sentir fiebre o dolor leve pero efectos graves son muy infrecuente.



Los niños necesitan vacunas a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 12 meses, 15 meses, 2 años, y de 4 a 6 años.



Para estar completamente protegidos, los niños tienen que recibir TODAS sus vacunas a tiempo, siempre.



Vacunas son requeridas por ley para entrar a guarderías, jardín de infantes, y escuelas certificadas en California.



Vacune a su niño/a.



Llame a su doctor o clínica hoy para hacer una cita.



Lleve la tarjeta amarilla de su niño/a (archivo de vacunas) a cada cita.



Haga la próxima cita antes de salir de la oficina de su doctor o clínica.



Sí falta una cita, llame a la clínica o a la oficina de su doctor para hacer otra.



No se necesita aseguranza ni dinero para recibir buenos servicios médicos. Hay clínicas comunitarias para servirle a usted y a su familia para que nuestra comunidad esté sana y saludable.

**Para vacunas GRATIS
o de bajo costo, llame al
1-800-427-8700.**

Los niños tienen que ir acompañados por un padre o tutor legal.



Proyecto de Promotoras de Vacunación

Esto no duele...



Adoptado del Departamento de Servicios de Salud de Hawai'i

...tanto como esto.



Hepatitis A & hepatitis B son infecciones que pueden causar pérdida de apetito, náusea, vómito, e ictericia (ojos y piel de color amarillo); fallecimiento del hígado, y hasta la muerte. Hepatitis B también puede ser causante de cáncer del hígado. Un examen de la sangre se usa para saber que tipo de hepatitis tiene la persona.

Las vacunas han reducido y en algunos casos han eliminado muchas enfermedades que causaban daño o fallecimiento a los niños. Los virus y las bacterias que causan estas enfermedades todavía existen y pueden ser transmitidos a personas que no han recibido sus vacunas.



Hemofilo influenza tipo b (Hib) puede causar meningitis (inflamación del cerebro) que pueda resultar en sordera, convulsiones, o retraso mental.

Neumococo puede causar infecciones en la sangre, oído, y el cerebro (meningitis), y neumonía (infección de los pulmones). Los niños, especialmente los menores de 5 años, corren más riesgo de contraer esta enfermedad y tener complicaciones.



Difteria puede causar una capa gruesa al fondo de la garganta que puede hacer que la respiración se dificulte. También puede causar sofoco, parálisis, y un paro cardíaco.

Tétano puede causar dolorosas convulsiones musculares en el cuello, los brazos, las piernas, la espalda, y en el abdomen. También puede hacer que la quijada se cierre y la persona no pueda abrir su boca o pasar alimentos. El tétano puede causar hasta la muerte.



Tos ferina puede causar una tos fuerte y sofoco que hacen difícil el respirar. La tos puede durar varias semanas y ser causante de daño cerebral o la muerte especialmente en los niños menores de 1 año.



Polio es una enfermedad que puede dejar a la persona lisiada y puede causar parálisis (incapacidad de los brazos y las piernas) y muerte.



Sarampión puede causar salpullido, fiebre, tos, y la pulmonía (infección de los pulmones), meningitis (inflamación del cerebro), sordera, y muerte.

Paperas pueden causar la fiebre y la dolorosa inflamación de las glándulas debajo de la quijada. Pueden ser causante de meningitis (inflamación del cerebro) y sordera.



Rubéola (sarampión alemán) es normalmente una enfermedad leve en los niños. Sin embargo los niños infectados pueden contagiar a las mujeres embarazadas. Los bebés recién nacidos de mujeres con rubéola pueden nacer con defectos físicos.

Varicela (viruela o chicken pox) puede causar salpullido con comezón y cicatrices. Puede causar serias complicaciones como la pulmonía (inflamación de los pulmones), inflamación del cerebro, y posiblemente muerte.



Vacune a su niño/a.